

Yuskin I Lotion 悠斯晶愛 止癢劑

醫師藥師藥劑生指示藥品

有效成分 (1g 中)：

Crotamiton(止癢成分)..... 20mg Diphenhydramine(抗組織胺劑)(止癢成分)10mg Glycyrrhetic Acid(抗炎成分).....10mg
Isopropylmethylphenol (抗菌成分)..... 5mg Tocopherol Acetate(Vit E)..... 5mg

其他成分 (賦形劑)：

1,3-Butylene Glycol, Glycerin, Glyceryl Triisooctanoate, Olive Oil, Hydrogenated Soybean Phospholipid, Polyoxyethylene Hydrogenated Castor Oil 20, Sorbitan Monostearate, Cetostearyl Alcohol, Dimethylpolysiloxane, Isopropyl Myristate, Stearic Acid, Cetyl Palmitate, Methyl Parahydroxybenzoate, Xanthan Gum, Carboxyvinyl Polymer, Triethanolamine, Purified Water

* 保濕成分 (賦形劑)：[1,3-Butylene Glycol], [Glyceryl Triisooctanoate], [Olive Oil], [Glycerin]

用途 (適應症)：

搔癢、皮膚炎、以及伴隨濕疹、蕁麻疹、斑疹、汗疹...等症狀所引起的搔癢。

使用上注意事項：

1. 有下列情形者，請勿使用：曾因本藥成分引起過敏的人。
2. 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
 - ① 3 歲以下。
 - ② 有深部皮膚組織感染。
3. 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
 - ① 正在接受醫師治療者。
 - ② 本人或家族有過敏體質者。
 - ③ 曾經因使用藥品或化妝品引起過敏症狀者。
 - ④ 兒童、孕婦，可能懷孕婦女及哺乳婦。
 - ⑤ 要使用於臉部。
4. 其他使用上注意事項：
 - ① 勿超過建議使用量或使用次數。
 - ② 本品不可使用於皮膚糜爛或傷口。
 - ③ 本藥限於外用不得內服，亦不得用於眼睛四周或黏膜（如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等），潰爛、龜裂或嚴重外傷的患部。
 - ④ 使用於小孩時，要有大人在旁監督指導。
 - ⑤ 為防止兒童誤食，請放在兒童拿不到的地方。
 - ⑥ 請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立刻前往眼科就醫。
 - ⑦ 避免日光直射，盡可能放在陰涼處，旋緊蓋子保存。
 - ⑧ 不要分裝到其他的容器，以免誤用或變質。
 - ⑨ 避免陽光直射。
 - ⑩ 使用部位或其周圍髒汙時，請洗乾淨後再用藥。
 - ⑪ 使用本藥前後應徹底洗淨雙手。
 - ⑫ 本藥物使用於大面積之體表（以超過使用者的兩手掌面積為參考）。
 - ⑬ 使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用。
 - ⑭ 請勿使用在患部以外，也勿當做預防使用。
 - ⑮ 本藥不可連續使用超過 7 天。

用法用量：依醫師、藥師、藥劑生指示使用。先清潔患部，取適量塗抹，一天使用 2-3 次。

警語：

- 服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生。

身體部位	副作用
皮膚	發疹、紅疹、發癢

- 服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
 - ① 小孩誤食時，請先將口中擦拭乾淨。再觀察一陣子，如果有異常，請諮詢醫師。
 - ② 若不慎進到眼睛時，請立刻用水或溫水沖洗。如果症狀嚴重，請至眼科就診。
 - ③ 若有上述之外其他不適情況產生。
 - ④ 使用 7 天後，自覺狀況沒有改善或更惡化。

包裝：1000 公克以下塑膠瓶裝

貯存方法： 25°C 以下

衛署藥輸字第 025716 號

製造廠：Yuskin Pharmaceutical Co.,Ltd Toyama Factory

廠址：3-2,Yasuuchi,Yatsuomachi,Toyama City,Toyama Pref,Japan

藥商：輝生貿易有限公司 消費者服務熱線：0800-000-126

地址：台北市松山區八德路四段 135 號 3F 之 1

不含類固醇成分

